



La Púrpura Trombocitopénica Idiopática, es un trastorno autoinmune caracterizado por un descenso de la cifra de plaquetas, acompañado habitualmente de diátesis hemorrágica. Se caracteriza por hemorragias cutáneas en forma de petequias puntiformes y equimosis en piel y mucosas. El tratamiento se basa en Prednisona, inmunoglobulinas intravenosas, Esplenectomía y recientemente Rituximab, todos con efectos secundarios indeseables.

Presentamos un caso de una paciente femenina, 40 años de edad, acude a emergencia del Hospital J. D. Maridueña con cuadro clínico de 2 semanas de evolución caracterizado por petequias generalizadas más sangrado transvaginal abundante, además la paciente indica cefalea y artralgias, manifiesta haber realizado deposiciones oscuras.

Palabras Clave: Púrpura Trombocitopénica Idiopática, Diátesis Hemorrágica.

Translation:

Idiopathic thrombocytopenia purpura, is an autoimmune disorder characterized by decreased platelet count, usually accompanied by bleeding diathesis. It characterized by bleeding skin as punctate petechiae and ecchymosis Skin and mucous. The treatment is based on prednisone, intravenous immunoglobulin, splenectomy and Rituximab recently, all with undesirable side effects.

We present a case of a female patient, 40 years old, goes to the hospital emergency J. D. Clinical Maridueña with 2 weeks of evolution characterized by generalized petechiae more

abundant TVB also indicates the patient headache and arthralgia, dark stools have made manifest.

Key Words: Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, Hemorrhagic Diathesis

Dr. James Neira. Cirujano General. Sala San Aurelio, Hospital Luis Vernaza.

Dr. Leonardo Abad. Médico General.

Dra. Rosa Santana. Médico General.

Dr. Christian Castro. Médico General.