



Los bezoares son formaciones extrañas indigeribles que se forman en el tracto gastrointestinal. Entre la variedad de bezoares que existen, los tricobezoares tienen un porcentaje alto de incidencia. Se presentan en pacientes predominantemente femeninos y con algún tipo de trastorno de la conducta. Su diagnóstico se orienta a través de la semiología y la imagenología, que nos indican la presencia de una masa en cavidad gástrica. La resolución siempre es de tipo quirúrgico. Presentamos el caso de una paciente pediátrica de 7 años de edad con diagnóstico de tricobezoar.

Palabras Clave: Tricobezoar, Bezoar, Masa Gástrica.

Translation

Bezoars are alien collections of indigestible material in the gastrointestinal tract. Throughout the variety of existing bezoars, trichobezoars have a high incidence percentage. They present predominantly in female patients with psychiatric conditions. Its diagnosis is given through semiology and imagenology which indicate the presence of a mass in the gastric cavity. Treatment is always surgical. We present the case of a 7 year old pediatric patient with diagnosis of trichobezoar.

Key Words: Trichobezoar, Bezoar, Gastric Mass.

Dr. Hugo Cedeño, Cirujano Jefe. Sala B2. Hospital Roberto Gilbert.

Dra. María Isabel Sánchez, Pediatra Clínica. Sala B2. Hospital Roberto Gilbert.

Dra. Isabel María Salcedo, Pediatra Clínica. Sala B2. Hospital Roberto Gilbert.

Dr. Ernesto Fabre, Cirujano Pediatra. Hospital Roberto Gilbert.

Dr. Christian Mena Cedeño, Residente de Cirugía. Hospital Roberto Gilbert.